South Central District Health
Keeping your family and community healthy
1020 Washington Street N • Twin Falls, ID 83301
(208) 734-5900 Ext. 239

PROFILAXIS PARA EL ÁNTRAX

DEPENDIENDO DE SU EDAD, PESO, Y CONDICIONES MEDICAS PREEXISTENTES, SUS ANTIBIÓTICOS PUEDEN VARIAR DE ÉSOS ENUMERADOS ABAJO.

Adultos:

- Ciprofloxacin: 500 mg pildoras dos veces al día por 60 días

Tratamientos Alternativos:
- Amoxicillin: 500mg pildoras 3 veces al día por 60 días
- Doxycycline: 100 mg pildoras 2 veces al día por 60 días

Niños:

- Pildoras de Ciprofloxacin 2 veces al día por 60 días (la dosis exacta depende del peso del niño)

Tratamiento Alternativo:
- Pildoras de Amoxicillin 3 veces al día por 60 días (la dosis exacta depende del peso del niño)

Mujeres Embarazadas:

- Ciprofloxacin: 500 mg píldoras 2 veces al día por 60 días

Tratamiento Alternativo:
- Amoxicillin: 500 mg píldoras 3 veces al día por 60 días

USTED DEBE TOMAR TODA LA MEDICACIÓN DURANTE EL PERÍODO RECOMENDADO.

SI USTED EXPERIMENTA ALGUNA SÍNTOMA, PONGASE EN CONTACTO CON UN PROVEEDOR DEL CUIDADO MÉDICO *INMEDIATAMENTE.*